

MICOSAN CLOTRIMAZOL

FORMULA
CLOTRIMAZOL: 1%
EXCIPIENTES: C.S.



ACCIÓN TERAPÉUTICA Y CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA

Antimicótico de amplio espectro. Funguicida local.

El clotrimazol es un derivado imidazólico con actividad sobre una amplia variedad de micosis dérmicas superficiales y vaginales. Su espectro incluye: dermatofitos (*Trychophyton*, *Microsporum* y *Epidermophyton*), levaduras (*Candida*) y otros hongos como *Malassezia furfur* (pitiriasis versicolor).

Tiene como característica distintiva el hecho de no fomentar el desarrollo de resistencias.

La capacidad de penetración es tan buena que 6 horas después de la aplicación los valores CIM encontrados en pruebas in vitro para los hongos importantes en dermatomicosis son alcanzados aún en las capas más profundas de la epidermis.

En las investigaciones de absorción no pudieron comprobarse cantidades de sustancia activa medibles en el suero. Por lo tanto no debe contarse con un efecto sistémico por la aplicación local.

INDICACIONES

- Dermatofitos: tiñas de cuero cabelludo, de piel glabra, de uñas.
- Intertigos: pie de atleta, eczema marginado.
- Pitiriasis versicolor.
Candidiasis: intertigos, onixis y perionixis, balanitis.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al clotrimazol o a otros antimicóticos imidazólicos.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS

No se han informado interacciones con medicamentos o alimentos. No se han informado hasta la fecha alteraciones de las pruebas de laboratorio.

REACCIONES ADVERSAS

En general son leves y no requieren la suspensión del tratamiento. Los efectos indeseados más frecuentes fueron: irritación y dolor local, rash cutáneo, calambres abdominales y aumento de la frecuencia urinaria.

En raras ocasiones se formaron edemas locales.

PRECAUCIONES

No se ha demostrado su inocuidad durante el embarazo.

Emplear medidas higiénicas complementarias para evitar las reinfecciones.

Si existiera una baja respuesta al tratamiento con clotrimazol, deben repetirse los estudios microbiológicos apropiados para confirmar el diagnóstico y excluir otros agentes patógenos.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Crema: aplicar mediante fricción, en capa fina sobre las zonas afectadas, 2 a 3 veces al día, durante 2 a 4 semanas de acuerdo a prescripción médica. Esta presentación es solo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos. No aplicar en zonas de la piel dañadas o con heridas. Mantener las zonas afectadas al aire para dejarlas secar. Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente inferior a 25°C.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo como por 20 gramos de clotrimazol al 1%.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LABORATORIOS PELLIER, REG.Nº: 451

Belgrano 2975

Industria Uruguaya

D.T.Q.F. Graciela Fiorentino